

KWESTIONARIUSZ OCENY NASILENIA PRZEDWCZESNEGO WYTRYSKU PEDT

Imię i Nazwisko:.....

Data wypełnienia kwestionariusza:.....

INFORMACJE O KWESTIONARIUSZU:

Jakość życia seksualnego mężczyzny jest niezwykle istotną częścią jego ogólnego stanu zdrowia, nie tylko bezpośrednio, ale także wpływając na inne aspekty życia. Przedwczesny wytrysk to jedna z najczęstszych przyczyn obniżenia jakości życia seksualnego. Aby zobiektywizować i ocenić w mierzalny sposób obecność tych zaburzeń, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza. Dzięki temu Pański lekarz będzie miał możliwość oceny potrzeby terapii, wyboru jej intensywności oraz analizy jej efektów

W poniższej tabeli znajdują się pytania . Przy każdym pytaniu prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź – tą, która Pana zdaniem najlepiej obrazuje Pańską sytuację.

W CIĄGU OSTATNICH 4 TYGODNI:

Jak trudno jest Panu opóźnić wytrysk?	0 bez trudu	1 nieznacznie trudno	2 umiarkowanie trudno	3 bardzo trudno	4 ekstremalnie trudno
Czy ma Pan wytrysk wcześniej niż by Pan sobie tego życzył?	0 prawie nigdy lub nigdy	1 rzadziej niż w połowie przypadków	2 w około połowie przypadków	3 częściej niż w połowie przypadków	4 prawie zawsze lub zawsze
Czy miewa Pan wytrysk przy minimalnej stymulacji?	0 prawie nigdy lub nigdy	1 rzadziej niż w połowie przypadków	2 w około połowie przypadków	3 częściej niż w połowie przypadków	4 prawie zawsze lub zawsze
Czy odczuwa Pan frustrację związaną z przedwczesnym wytryskiem?	0 wcale	1 nieznacznie	2 umiarkowanie	3 bardzo	4 ekstremalnie
Jak bardzo martwi się Pan, że Pana czas do wytrysku pozbawia partnerkę satysfakcji seksualnej?	0 wcale	1 nieznacznie	2 umiarkowanie	3 bardzo	4 ekstremalnie

Wynik (pkt):.....

Wynik równy bądź mniejszy od 8 punktów z dużym prawdopodobieństwem wyklucza poważne zaburzenia związane z przedwczesnym wytryskiem. Należy mieć jednak na uwadze, że podstawą wdrożenia postępowania terapeutycznego jest brak satysfakcji pacjenta ze swojego życia seksualnego, a kwestionariusz stanowi jedynie narzędzie pomocnicze. Wynik równy bądź wyższy od 11 punktów jest podstawą do specjalistycznej konsultacji lekarskiej, diagnostyki i włączenia leczenia